

Zapotrzebowanie na koncentrat czynnika krzepnięcia lub desmopresynę do RCKiK w Zielonej Górze ul. Zyty 21

Imię i nazwisko.....

PESEL Data urodzenia (dd-mm-rrrr)

Rodzaj skazy krwotocznej oraz postać:

- | | | | |
|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> hemofilia A | <input type="checkbox"/> ciężka | <input type="checkbox"/> umiarkowana | <input type="checkbox"/> łagodna |
| <input type="checkbox"/> hemofilia B | <input type="checkbox"/> ciężka | <input type="checkbox"/> umiarkowana | <input type="checkbox"/> łagodna |
| <input type="checkbox"/> choroba von Willebranda | <input type="checkbox"/> typ 1 | <input type="checkbox"/> typ 2 | <input type="checkbox"/> typ 3 |
| <input type="checkbox"/> nabyty zespół von Willebranda | | | |
| <input type="checkbox"/> niedobór czynnika V | <input type="checkbox"/> niedobór czynnika VII | | |
| <input type="checkbox"/> niedobór czynnika X | <input type="checkbox"/> niedobór czynnika XI | | |
| <input type="checkbox"/> nabyta hemofilia A | <input type="checkbox"/> niedobór czynnika XIII | | |
| <input type="checkbox"/> inne* | | | |

*podać jakie

Obecność inhibitora:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> niskie miano (poniżej 5 jednostek Bethesda) | <input type="checkbox"/> wysokie miano (powyżej 5 jednostek Bethesda) |
|--|---|

Rodzaj produktu leczniczego stosowanego w Programie (nazwa)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> koncentrat czynnika VIII | <input type="checkbox"/> koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa |
| <input type="checkbox"/> koncentrat rekombinowanego czynnika VIII | |
| <input type="checkbox"/> koncentrat czynnika IX | <input type="checkbox"/> koncentrat fibrynogenu |
| <input type="checkbox"/> koncentrat rekombinowanego czynnika IX | |
| <input type="checkbox"/> koncentrat czynnika VIII zawierający czynnik von Willebranda | <input type="checkbox"/> koncentrat czynnika XIII |
| <input type="checkbox"/> koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny aPCC | |
| <input type="checkbox"/> koncentrat czynników zespołu protrombiny PCC | <input type="checkbox"/> desmopresyna |
| <input type="checkbox"/> koncentrat czynnika VII | |

Data (dd-mm-rrrr)

Zalecana ilość czynnika / desmopresyny.....

Wskazania do wydania koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny, zgodnie z programem zdrowotnym Ministra Zdrowia pn. "Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018":

1. Koncentrat czynnika VIII

- leczenie w warunkach domowych chorego na ciężką postać hemofilii A
 - program ITI u dorosłego chorego na hemofilię A powiklaną inhibitorem czynnika VIII
 - program ITI u dziecka chorego na hemofilię A powiklaną inhibitorem czynnika VIII
 - wykonanie zabiegu operacyjnego ze wskazań życiowych
 - wykonanie planowanego zabiegu operacyjnego według wskazań lekarskich
 - wtórna profilaktyka u dorosłego chorego na hemofilię A o ciężkim przebiegu (co najmniej 1 krwawienie w miesiącu lub co najmniej 3 krwawienia do tego samego stawu w ciągu 3 miesięcy lub przebyte samoistnego krwawienia zagrażającego życiu, np. krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego)
 - leczenie wylewów śródstawowych u dzieci zakwalifikowanych do terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ pn. "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B"
 - zabezpieczenie operacji i zabiegów u dzieci zakwalifikowanych do terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ pn. "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B"
- inne: np.: leczenie w warunkach domowych, hemofilia A łagodna postać (wylewy, krwawienia)
- np.: leczenie szpitalne, hemofilia A łagodna postać (wylewy, krwawienia, niewielki zabieg chirurgiczny)

2. Koncentrat rekombinowanego czynnika VIII do leczenia krwawień u dzieci, które nie otrzymywały wcześniej preparatów krwiopochodnych, zakwalifikowanych do modułu pierwotnej profilaktyki krwawień czynnikami rekombinowanymi w ramach programu NFZ pn. "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B" oraz włączenie nowych dzieci, do leczenia, na tych samych zasadach, niezależnie od ciężkości hemofilii

- zabezpieczenie wylewów śródstawowych
- zabezpieczenie zabiegów chirurgicznych
- program ITI u dziecka które wytworzyło inhibitor przed włączeniem do programu "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B" a stosowało w terapii "na żądanie" koncentraty rekombinowanych czynników krzepnięcia

3. Koncentrat czynnika IX

- leczenie domowe chorego na ciężką postać hemofilii B
 - program ITI u dorosłego chorego na hemofilię B powiklaną inhibitorem czynnika IX
 - program ITI u dziecka chorego na hemofilię B powiklaną inhibitorem czynnika IX
 - wykonanie zabiegu operacyjnego ze wskazań życiowych
 - wykonanie zabiegu planowego według wskazań lekarskich
 - wtórna profilaktyka u dorosłego chorego na hemofilię B o ciężkim przebiegu (co najmniej 1 krwawienie w miesiącu lub co najmniej 3 krwawienia do tego samego stawu w ciągu 3 miesięcy lub przebyte samoistnego krwawienia zagrażającego życiu, np. krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego)
 - leczenie wylewów śródstawowych u dzieci zakwalifikowanych do terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ pn. "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B"
 - zabezpieczenie operacji i zabiegów u dzieci zakwalifikowanych do terapeutycznego programu zdrowotnego NFZ pn. "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B"
- inne: np.: leczenie w warunkach domowych Hemofilia B łagodna postać (wylewy, krwawienia)
- np.: leczenie szpitalne Hemofilia B łagodna postać (wylewy, krwawienia, niewielki zabieg chirurgiczny)

4. Koncentrat rekombinowanego czynnika IX do leczenia krwawień u dzieci, które nie otrzymywały wcześniej preparatów krwiopochodnych, zakwalifikowanych do modułu pierwotnej profilaktyki krwawień czynnikami rekombinowanymi w ramach programu NFZ pn. "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B" oraz włączanie nowych dzieci, do leczenia na tych samych zasadach, niezależnie od ciężkości hemofilii

- zabezpieczenie wylewów śródstawowych
- zabezpieczenie zabiegów chirurgicznych
- program ITI u dziecka które wytworzyło inhibitor przed włączeniem do programu "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B" a stosowało w terapii "na żądanie" koncentraty rekombinowanych czynników krzepnięcia

5. Koncentrat czynnika VIII zawierający czynnik von Willebranda, zarejestrowany ze wskazaniem do leczenia choroby von Willebranda

- leczenie w warunkach domowych chorego na chorobę von Willebranda o najcięższym przebiegu klinicznym
- pilny zabieg u pacjenta z ciężką postacią choroby von Willebranda
- inne:

6. Koncentrat zespołu protrombiny (PCC)

- zabezpieczenie krwawień u pacjenta z niedoborem czynnika X, czynnika II oraz złożonym niedoborem czynników kompleksu protrombiny
- inne:

7. Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC)

- leczenie krwawień u chorego z inhibitorem czynnika VIII o wysokim mianie
- leczenie krwawień u chorego z inhibitorem czynnika IX o wysokim mianie
- leczenie krwawień zagrażających życiu u chorego z inhibitorem czynnika VIII o wysokim mianie
- leczenie krwawień zagrażających życiu u chorego z inhibitorem czynnika IX o wysokim mianie
- zabieg operacyjny ze wskazań życiowych u chorego z inhibitorem czynnika VIII o wysokim mianie
- zabieg operacyjny ze wskazań życiowych u chorego z inhibitorem czynnika IX o wysokim mianie
- leczenie krwawień u chorego w przebiegu nabytej hemofilii
- zabieg operacyjny u chorego w przebiegu nabytej hemofilii
- osłona dużego zabiegu chirurgicznego u pacjenta z niedoborem czynnika VII
- leczenie krwawień zagrażających życiu u chorego z niedoborem czynnika VII
- osłona dużego zabiegu chirurgicznego u chorego z ciężką trombocytopatią
- leczenie krwawień zagrażających życiu u chorego z ciężką trombocytopatią
- obecność alloprzeciwciał przeciwplateletowych
- profilaktyka wtórna u chorego ze skazą krwotoczną powiklaną inhibitorem o ciężkim przebiegu (co najmniej 1 krwawienie w miesiącu lub co najmniej 3 krwawienia do tego samego stanu w ciągu 3 miesięcy lub przebyte samoistnego krwawienia zagrażającego życiu, np. krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego)
- inne:

8. Koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa

- leczenie krwawień u chorego z inhibitorem o wysokim mianie
- leczenie krwawień zagrażających życiu u chorego z inhibitorem o wysokim mianie
- wykonanie zabiegów operacyjnych ze wskazań życiowych u chorego z inhibitorem o wysokim mianie
- leczenie krwawień u chorego w przebiegu nabytej hemofilii
- zabieg operacyjny u chorego w przebiegu nabytej hemofilii
- osłona dużych zabiegów chirurgicznych u pacjenta z niedoborem czynnika VII
- leczenie krwawień zagrażających życiu u chorego z niedoborem czynnika VII
- obecność alloprzeciwciał przeciwplateletowych
- inne:

9. Koncentrat czynnika VII

- nagły zabieg operacyjny
- planowy zabieg operacyjny
- leczenie domowe - zabezpieczenie bieżących krwawień u chorego z niedoborem czynnika VII
- inne:

10. Koncentrat fibrynogenu

- leczenie chorego z hypofibrynogenią
- inne:

11. Koncentrat czynnika XIII

- bezterminowa profilaktyka krwawień u pacjenta z niedoborem czynnika XIII
- inne:

12. Desmopresyna

- krwawienia
- zabieg operacyjny
- profilaktyka

.....
data

.....
czytelny podpis i pieczętka lekarza

.....
pieczętka przychodni / oddziału szpitalnego